



【EC+Pem-mab療法について】
(エピルビシンNK+エンドキサン+キイトルーダ)



様 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
			6/6 木	6/7 金	6/8 土	6/9 日	6/10 月	6/11 火	6/12 水	6/13 木	6/14 金	6/15 土	6/16 日	6/17 月	6/18 火	6/19 水	6/20 木	6/21 金	6/22 土	6/23 日	6/24 月	6/25 火	6/26 水	6/27 木
ソラナックス錠	安定剤です	朝・夕 内服																						
ナウゼリンOD錠	吐き気止めです	朝・昼・夕食前内服																						
ムコスタ錠	胃薬です	朝・昼・夕食前内服																						
デカドロン錠	吐き気止めです	朝・昼 内服																						
キイトルーダ注	200 mg/Body	抗がん剤です																						
アロカリス注 アロキシバグ デキサート注	9.9 mg力価	吐き気止めです																						
エピルビシンNK注	90 mg/m ² (総投与量<900mg/m ²)	抗がん剤です																						
エンドキサン注	600 mg/m ²	抗がん剤です																						

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
		6/6 木	6/7 金	6/8 土	6/9 日	6/10 月	6/11 火	6/12 水	6/13 木	6/14 金	6/15 土	6/16 日	6/17 月	6/18 火	6/19 水	6/20 木	6/21 金	6/22 土	6/23 日	6/24 月	6/25 火	6/26 水	6/27 木	
自覚症状	食欲不振・吐き気																							
	出血性膀胱炎(血尿・排尿痛)																							
	口内炎																							
	色素沈着																							
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																							
検査値	白血球減少																							
	赤血球減少(貧血)																							
	血小板減少																							

心機能低下(治療回数が増えると生じることがあります。息苦しさなどがありましたらお知らせ下さい。)

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

間質性肺炎	息苦しい、咳が増えた、37.5℃以上の発熱
下痢 大腸炎	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。
内分泌障害	体がだるい 食欲が落ちる 吐き気
皮膚症状	発疹、かゆみなど
静脈血栓症	むくみや腫れ
重症筋無力症	まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある
神経症状	手足のしびれが 力が入りにくい
I型糖尿病	のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部