



【IRIS+BV療法について】
(S-1+カンプト+アバステン)



様

コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目		
			3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5		
アロキシバグ		吐き気止めです	🚰																														🚰
デキサート注	9.9 mg力価																																
カンプト注	125 mg/m ²	抗がん剤です	🚰																														
アバステン注	7.5 mg/kg	抗がん剤です	🚰																														
エスワンOD錠	体表面積1.25㎡未満: 初回基準量(テガフル相当量)40mg/回 体表面積1.25㎡以上1.5㎡未満: 初回基準量(テガフル相当量)50mg/回 体表面積1.5㎡以上: 初回基準量(テガフル相当量)60mg/回	1日2回	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	🍯	
デカドロン錠		吐き気止めです	🏠	🏠														🏠	🏠														

😊 **治療による副作用**

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目				
	3/8	3/9	3/10	3/11	3/12	3/13	3/14	3/15	3/16	3/17	3/18	3/19	3/20	3/21	3/22	3/23	3/24	3/25	3/26	3/27	3/28	3/29	3/30	3/31	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5				
食欲不振・吐き気																																	
皮疹																																	
下痢																																	
口内炎																																	
色素沈着																																	
手足のしびれ																																	
脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																																	
白血球減少																																	
赤血球減少(貧血)																																	
血小板減少																																	
腎機能低下																																	
肝機能低下																																	

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ●出血(鼻血など) ●タンパク尿 ●胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ●傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください
0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部