



【XELOX+BV療法について】
(ゼローダ+エルプラット+アバステン)



様 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | 用量 | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 |
|----------------------|--|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 |
| グラニセトロンハック デキサート注 | 9.9 mg力価 | 吐き気止めです | 30分 | 💧 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 💧 |
| エルプラット注 | 130 mg/m ² | 抗がん剤です | 2時間 | 💧 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 💧 |
| アバステン注 | 7.5 mg/kg | 抗がん剤です | 90分 | 💧 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 💧 |
| デカドロン錠 | | 吐き気止めです | 朝・昼 内服 | | 🏠 | 🏠 | 🏠 | 🏠 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゼローダ錠 | 体表面積1.36m ² 未満:1200mg/回 体表面積1.36m ² 以上1.66m ² 未満:1500mg/回 体表面積1.66m ² 以上1.96m ² 未満:1800mg/回 体表面積1.96m ² 以上:2100mg/回 | 1日2回 抗がん剤です | 朝・夕 内服 | | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 | 📄 |

2回目から点滴時間が短くなることがあります。(30分)

1回1錠

1回 錠
(状態により変更になります)

😊 **治療による副作用**

注意が必要な時期

| | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1日目 | | |
|-----------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|
| | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | | |
| 自覚症状 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過敏症 | 痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 食欲不振・吐き気 | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手足のしびれ | 手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。冷たい物に触れないようにしましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 口内炎 | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下痢 | 便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手足症候群 | 手足がチクチクと痛い、赤く腫れる、ひび割れ、水疱が生じることがあるので、保湿剤を使い手足の乾燥を予防しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色素沈着 | 肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など) | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 白血球減少 | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤血球減少(貧血) | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血小板減少 | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肝機能低下 | 体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなるがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してく
0898-23-2000



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。

真泉会 今治第一病院 薬剤部