




# 【mFOLFOX6+P-mab療法について】

## (5-FU+レボホリナート+エルプラット+ベクティビックス)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前              | 用量                     | 作用             | めやすの時間 | 1日目                                                     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 17日目         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1日目  |
|-------------------|------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                   |                        |                |        | 7/2                                                     | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16         | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
|                   |                        |                |        | 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 月    |
| ソラナックス錠0.4mg      |                        | 安定剤です          | 前処置    | ☯️ 1錠                                                   |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | ☯️ 1錠        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ☯️   |
| ベクティビックス注         | 6 mg/kg                | 抗がん剤です         | 1時間    | 💧                                                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 💧            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 💧    |
| アロキシバッグ<br>デキサート注 | 9.9 mg力価               | 吐き気止めです        | 30分    | 💧                                                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 💧            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 💧    |
| エルプラット注           | 85 mg/m <sup>2</sup>   | 抗がん剤です         | 2時間    | 💧                                                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 💧            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 💧    |
| レボホリナート注          | 200 mg/m <sup>2</sup>  | 5-FUの効果を強める薬です |        | 🧒 この週はお休みです。                                            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 🧒 この週はお休みです。 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 💧    |
| 5-FU注             | 400 mg/m <sup>2</sup>  | 抗がん剤です         | 約5分    | 💧                                                       |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 💧            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 💧    |
| 5-FU注(持続)         | 2400 mg/m <sup>2</sup> | 抗がん剤です         | 46時間   | ↔️💧                                                     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | ↔️💧          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | ↔️   |
| デカドロン錠            |                        | 吐き気止めです        | 朝・昼 内服 | 🏠 1回1錠                                                  |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 🏠 1回1錠       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ナウゼリン錠            |                        | 吐き気止めです        | 毎食前 内服 | 🏠 1回1錠                                                  |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 🏠 1回1錠       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 🏠    |
| ソラナックス錠0.4mg      |                        | 安定剤です          | 朝・夕 内服 | 🏠 1回1錠                                                  |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 🏠 1回1錠       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 🏠    |

### 😊 治療による副作用

|      |                   | 1日目                                                                 |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      | 17日目 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1日目  |  |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|      |                   | 7/2                                                                 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |  |
|      |                   | 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日             |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 月    |  |
| 自覚症状 | 過敏症               | 痒みや顔のほてり、じんましん、脈が速い、息苦しいなどの症状が出た場合はお知らせ下さい。                         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      | 食欲不振・吐き気          | 食欲低下や吐き気がすることがあります。食べやすいものを無理なく食べ、水分を摂りましょう。                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      | 手足のしびれ            | 手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。冷たい物に触れないようにしましょう。                      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      | 口内炎               | 口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかりと行いましょう。                        |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      | 色素沈着              | 肌が黒ずむことがあります。長袖や帽子などを用いて、日光など紫外線には注意してください。                         |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      | 脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)   | 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配すぎないでください。                    |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      | 皮膚症状(皮疹、乾燥、爪囲炎など) | にきびのような発疹ができたり、皮膚が乾燥してひび割れができることがあるので、保湿剤を使うなどして予防しましょう。            |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 検査値  | 白血球減少             | 感染しやすくなりますので、手洗いうがいを心がけましょう。必要に応じて白血球数を上げる注射をすることがあります。発熱時はお知らせ下さい。 |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      | 赤血球減少(貧血)         | 貧血の症状(めまい・ふらつき)がでたりします。転倒に注意しましょう。                                  |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      | 血小板減少             | 出血しやすくなって手足に赤い点やあざがでたり、歯ぐきから血が出たりすることがあります。転倒に注意しましょう。              |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      | 肝機能低下             | 体がだるい、食欲がでない、皮膚のかゆみ、皮膚や白目が黄色くなる場合があります。                             |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。