

# 施設間薬剤情報連絡書 (AG)

令和 6年 06月 19日 退院

送付先: \_\_\_\_\_

担当薬剤師 御中 (FAX \_\_\_\_\_)

フリガナ 患者氏名	テスト カンジャ19 テスト 患者19
ID	9800000019
性別	: 男
生年月日	: 昭和 30年10月20日 ( 68 歳)

送信元 : (社) 真泉会 今治第一病院  
電話番号 0898(23)2000  
FAX 0898(23)5600  
◆施設間薬剤情報連絡書担当者名  
(問い合わせ先) :

いつもお世話になっております。このたびAG治療された上記患者様が当院退院となりました。退院に際して、今後の適切な薬剤使用のため、また、退院後に速やかに地域にお返しするためにも下記の情報提供(FAX送信)を送らせていただきます。

処置名 PCI(STENT) <処置後内服薬>  
処置日 令和 6年06月19日 抗血小板剤 エフィエント(プラスグレル),  
抗凝固剤 リクシアナ(エトキサパン),

## 使用薬(一般用医薬品・健康食品等を含む)情報

★お薬手帳 薬剤情報提供文書 院内パンフレット その他

医療機関(診療科名、処方医名) / 処方日又は調剤日 / 医薬品名 / 用法・用量 等

### ★ 添付資料参照

■○○Dr

エフィエント錠3.75mg[1錠]

タケキャブ錠20mg[0.5錠]

フォシーガ錠10mg[1錠]-----分1 朝食後,

リピートール錠10mg[1錠]-----分1 夕食後,

ピソノテープ4mg[0.5枚]--[外用], 1日1回,

■●●Dr

リクシアナOD錠60mg[1錠]

フェブキシostat錠20mg「トローワ」[1錠]----分1 朝食後,

### ★調剤上の留意点(粉碎・別包等)

1包化 ~令和 6年06月20日

シート ~

### ★副作用歴・アレルギー歴

あり 内容: バイアスピリンで胃腸障害

なし

不明

### ★服薬状況等

①服薬介助

自己管理

服薬支援

→管理・介助者( )

②アドヒアランス

良

不良

### ★その他特記事項(服薬指導上で注意すべき事項等)

DVTでリクシアナ服用中です。2023/1/23 呼吸苦+ AMI疑いで入院しました。PCIを実施し、ステント留置しています。バイアスピリンで胃腸障害のため、DAPTはエフィエントとプレタールでしたが、1/31~プレタールは中止しています。●●Dr処方分残薬あるため、残薬整理お願いします。●●Drは2/17、○○Drは2/21再診です。