



【Atez-mab療法(3W)について】 (テセントリク)



さま

1 コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前			めやすの 時間		1日目																					1日目
					9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16 9/17 9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23 9/24																					9/25
					木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水																					木
テセントリク注	1200mg/body	1時間										この週はお休みで							この週はお休みで							
																									2コース目から投与時間が短くなる場合があります。(30分)	

😊 治療による副作用

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかりませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目	
	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
間質性肺炎	息苦しい、咳が増えた、37. 5℃以上の発熱																						
下痢 大腸炎	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。																						
内分泌障害	体がだるい 食欲が落ちる 吐き気																						
皮膚症状	発疹、かゆみなど																						
静脈血栓症	むくみや腫れ																						
重症筋無力症	まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある																						
神経症状	手足のしびれがる 力が入りにくい																						
I 型糖尿病	のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える																						

●息切れ ●空咳 ●発熱時には当院に連絡してください



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部