



【Dur-mab+GC療法について】
(イミフィンジ+ゲムシタビン+ランダ)



様

1

コース目

お薬の名前と治療のスケジュール(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
		12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
イミフィンジ注	1500mg/body	1時間																					
パロノセトロンバック アロカリス注 デキサート注	0.75mg/50mL 235mg 6.6mg 力価	30分																					
硫酸マグネシウム液 生食	20mL 500mL	1時間																					
ランダ注	25mg/m ²	2時間																					
ゲムシタビン注	1000mg/m ²	30分																					
デカドロン錠4mg	1錠 分1	朝 内服		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	

腎臓を保護するため、たくさんの輸液を点滴します。
無理のない程度に水分補給をして、頻繁に尿を出しましょう。

この週は
お休みです。

治療による副作用

自覚症状	発熱	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
		12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
	食欲不振・吐き気																						
	血管痛・静脈炎																						
	口内炎																						
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																						
	手足のしびれ																						
	白血球減少																						
	赤血球減少(貧血)																						
	血小板減少																						
	腎機能低下																						
	肝機能低下																						

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていないが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

間質性肺炎	息苦しい、咳が増えた、37.5°C以上の発熱
下痢 大腸炎	便の回数が多くなったり強い腹痛をともなったり、水の様な便が出るときはお知らせ下さい。
内分泌障害	体がだるい 食欲が落ちる 吐き気
皮膚症状	発疹、かゆみなど
静脈血栓症	むくみや腫れ
重症筋無力症	まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある
神経症状	手足のしびれがる 力が入りにくい
I型糖尿病	のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部