




【Ipi-mab+Nivo-mab療法について】



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	めやすの 時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
		8/28 水	8/29 木	8/30 金	8/31 土	9/1 日	9/2 月	9/3 火	9/4 水	9/5 木	9/6 金	9/7 土	9/8 日	9/9 月	9/10 火	9/11 水	9/12 木	9/13 金	9/14 土	9/15 日	9/16 月	9/17 火	9/18 水
オプジーボ注 80mg/body	30分	💡																					💡
生理食塩液	30分	💡																					💡
ヤーボイ注 3mg/kg	30分	💡																					💡



この週は
お休みです。



この週は
お休みです。

😊 治療による副作用

	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	1日目
	8/28 水	8/29 木	8/30 金	8/31 土	9/1 日	9/2 月	9/3 火	9/4 水	9/5 木	9/6 金	9/7 土	9/8 日	9/9 月	9/10 火	9/11 水	9/12 木	9/13 金	9/14 土	9/15 日	9/16 月	9/17 火	9/18 水
間質性肺炎	息苦しい、咳が増えた、37.5℃以上の発熱																					
下痢 大腸炎	便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。																					
内分泌障害	体がだるい 食欲が落ちる 吐き気																					
皮膚症状	発疹、かゆみなど																					
静脈血栓症	むくみや腫れ																					
重症筋無力症	まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある																					
神経症状	手足のしびれがる 力が入りにくい																					
I型糖尿病	のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える																					

●息切れ ●空咳 ●発熱時には当院に連絡してください



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

真泉会 今治第一病院 薬剤部