



# 【mFOLFIRINOX療法について】

(フルオロウラシル+オキサリプラチン+レボホリナート+イリノテカン)





様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	めやすの時間	1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目
		4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14
パロセトロンパック アロカリス注 デキサート注	0.75mg/50mL 235mg/10mL 9.9mg	30分	☒													☒														☒
オキサリプラチン注	85mg/m <sup>3</sup>	2時間	☒													☒														☒
イリノテカン注	180mg/m <sup>3</sup>	2時間	☒													☒														☒
レボホリナート注	200mg/m <sup>3</sup>	2時間	☒													☒														☒
フルオロウラシル注(持続)	2400mg/m <sup>3</sup>	46時間	☒	☒												☒	☒													☒
ナウゼリンOD錠	1日3回毎食前 内服			☒	☒	☒																								
オランザピンOD錠	1日1回夕食後内服				☒																									
デカドロン錠	1日2回朝・昼食後内服					☒																								



😊 **治療による副作用**

: 注意が必要な時期

		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1日目	
		4/16	4/17	4/18	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/12	5/13	5/14	
自覚症状	食欲不振・吐き気																														
	口内炎																														
	手足のしびれ																														
	下痢																														
	色素沈着																														
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																														
検査値	白血球減少																														
	赤血球減少(貧血)																														
	血小板減少																														



- \* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- \* 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- \* それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- \* 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部