## 【nab-PTX+GEMについて】 (アブラキサン+ゲムシタビン)



コース目

様

**お夢の名前と治療のスケジュール**(副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療関始を延期することがあります。)

			1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		めやすの	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14
薬の名前	作用	時間	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火	水	木	金	±	日	月	火
<del>クラニセトロンーー</del> バック デキサート注	3mg 6.6mg	30分	9							9							9													
アブラキサン注	125mg/m2	30分	9							9							7							(		7	この <del>;</del> お休	週は みです。	<b>,</b>	
ゲムシタビン注	1000mg/m2	30分	9							9							9								00					

	治療による副作用																								:注意	が必要	な時期			
		1日目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1 5
		9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13	10/14	10
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
	発熱		寒、発熱があるときはお知らせください。																											
		悪寒、発熱があるときはお知らせください。																												
自覚症状	食欲不振・吐き気	合%和	「 F 下 わ I	はき与り	ミオスー	レがち	 ります。	合べか	<u> </u>	のた無	<b>班ナンノゼ</b>	ا م	ひた垣	[] [] <del> </del>	<u> </u>															
	筋肉痛•関節痛	及队队	7 1. (a.i.	  T	1980	.∠ <i>/</i> 3· <i>0</i> 3	7490	段、、19	יייטן	りを <del>無</del> 。	注のくと	<b>~、</b> 小	<u> </u>	7 <del>5 6 5</del>	J.										Т					
		眉や背	  中、腰	」 要や腕な	  どの筋	」 肉が痛	」 くなった	り、関値	L 節が痛	」 くなるこ	とがあ	L ります。																		
	<b>—</b> — .12			1																										
	口内炎	口の中が荒れて痛みが出ることがあります。歯磨き、うがいなど丁寧にしっかり行いましょう。																												
	手足のしびれ																													
		手足のしびれ、感覚が鈍るなどの症状が出ることがあります。																												
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																													
		<sup>1</sup> 髪質が少し変わることもありますが、治療後半年程度でまた生えてきますので、心配しすぎないでください。																												
	血管痛•静脈炎																													
	血官油 静脈炎	点滴の途中に、注射部分やその周りに違和感や痛みなどがあればお知らせください。																												
	白血球減少																													
	<b>一                                    </b>	感染し	かすく	なります	ので、	手洗い	うがいを	心がに	けましょ	う。必要	更に応じ	て白血	球数を	上げる	主射を	すること	上があり	ます。多	<b>*熱時</b> (	はお知ら	さてせる	い。								
検	去血球減小(谷血)																													
	赤血球減少(貧血)	貧血の	症状(	(めまい	・ふらつ	き)がつ	でたりし	ます。東	云倒に	主意しま	しょう。	•														•	•	•		
査 値	血小生活小																													
但	血小板減少	出血し	やすく	なって手	<b>手足に</b> が	赤い点々	<sub></sub> やあざが	でたり	、歯ぐき	から血	が出た	りする	ことがあ	ります	。転倒(	こ注意	しましょ	う。												
	肝機能低下	体がた	るい、	食欲が	でない、	、皮膚の	りかゆみ	、皮膚	や白目	が黄色	くなる	ことがあ	ります。			•	•							•	•					



- \*注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
  \*上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
  \*それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
  \*何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部